

Bra att veta

# Om mässling, påssjuka och röda hund



Folkhälsomyndigheten

Mässling, påssjuka och röda hund är tre mycket smittsamma och allvarliga sjukdomar. De är ovanliga i Sverige i dag men finns runt om i världen. Genom vaccination skyddas ditt barn mot sjukdomarna.

**Mässling** ger hög feber, hosta och utslag och kan ge följsjukdomar som hjärninflammation, öroninflammation och lunginflammation. Det finns ingen behandling mot mässling, och det händer att sjukdomen leder till döden.

**Påssjuka** är en infektion som främst drabbar spottkörtlarna, men den kan också ge följsjukdomar som hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Pojkar kan få inflammation i testiklarna. Det finns ingen behandling mot påssjuka.

**Röda hund** ger en infektion som ofta är lindrig för barn och vuxna. Men om en gravid kvinna smittas av röda hund finns det stor risk för missfall eller att barnet föds med allvarliga fosterskador. Det finns ingen behandling mot röda hund.

## Skydd genom vaccination

Det mest effektiva sättet att skydda ditt barn är genom vaccination. Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är mycket välbeprövat och effektivt. Alla vacciner som erbjuds inom barnhälsovården och elevhälsan är frivilliga och kostnadsfria. Tänk på att se över familjens vaccinationsskydd innan ni reser utomlands.

## Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta din barnavårdscentral (BVC) eller skolans elevhälsa om du har frågor. Du kan också läsa mer på:

- [1177.se](http://1177.se)
- [Folkhalsomyndigheten.se](http://Folkhalsomyndigheten.se)
- [Lakemedelsverket.se](http://Lakemedelsverket.se)

## SÅ HÄR GÅR VACCINATIONEN TILL

### Före vaccinationen

Om ditt barn går i skolan är det bra om ni kan prata om vaccinationen i förväg. Han eller hon har kanske funderingar och behöver känna sig förberedd innan det är dags att ta sprutan. Om du som förälder behöver stöd kan du vända dig till barnets BHV-sjuksköterska (barnhälsovårdssjuksköterska) eller skolsköterska.

### Vaccinationen

Vaccinet ges med en spruta i låret eller överarmen, beroende på barnets ålder.

### Efter vaccinationen

De allra flesta känner ingenting efter vaccinationen eller blir bara lite ömma vid sprutsticket. Några kan få milda utslag och feber efter 7-12 dagar.

Om du är orolig över något efter vaccinationen ska du kontakta ditt barns BHV-sjuksköterska, skolsköterska eller sjukvården.

## SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM

Här ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige, för att förebygga allvarliga sjukdomar.

