

Handhygien

Metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel

Det här verktyget inne håller två enkla metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel.

Den första används för halvårsvisa mätningar och den andra för mätningar under en kortare period, till exempel i samband med en hygienintervention.

Förbrukningen av handdesinfektionsmedel ger ett indirekt mått på följsamheten till handhygien. Det kan ses som ett komplement till de direkta följsamhetsmätningarna som görs genom observation och självskattning.

Metod för kontinuerlig mätning – lämpligen varje halvår

1. Begär beställningslistor från inköpsavdelningen som avser inköpta desinfektionsmedel under det senaste halvåret. Räkna om antalet flaskor till liter.
2. Ta fram aktuell vårdstatistik för enheten. Statistiken kan vara i form av antal vård dagar, mottagningsbesök, behandlingar, operationer eller motsvarande för senaste halvåret. Om det inte går att ta fram sådan statistik kan man mäta den totala förbrukningen av handdesinfektionsmedel i liter.
3. Dela antalet liter beställt handdesinfektionsmedel med antalet vård dagar eller annat värde enligt punkt 2. Detta ger ett mått på enhetens förbrukning av handdesinfektionsmedel per vårdinsats under den aktuella perioden.

Enhetens namn:

Produktens namn:

Resultat

Handdesinfektionsmedel: Gel Tunnflytande Annat (t.ex. ej alkoholbaserat)

Mätperiod	Beställd mängd (anges i liter)	Antal vård dagar, mottagningsbesök, behandlingar eller operationer	Förbrukning av handdesinfektionsmedel per vårdinsats (antal vård dagar, mottagningsbesök, behandlingar eller operationer)
1:a halvåret 20__			
2:a halvåret 20__			
Totalt 20__			

Uppföljning av resultat

- Resultaten från mätningarna delges ansvariga chefer på alla nivåer och tas upp på arbetsplatsträffar.
- Resultaten ska användas som grund för fortsatt förbättringsarbete.
- Om mätningen avser att utvärdera en intervention tyder en ökad förbrukning av handdesinfektionsmedel på en lyckad intervention. Oförändrade eller nedåtgående trender måste följas upp noggrant.
- Resultat från enskilda enheter kan föras samman till större områden, t.ex. till kliniker, sjukhus eller kommuner.

Metod vid mätning under kortare tidsperiod – lämpligen två veckor

Vid beräkning av förbrukningen under en kortare tidsperiod utgår man från att mängden handsprit i öppnade flaskor på enheten är ungefär densamma vid mätperiodens början som vid dess slut. Dessa flaskor behöver alltså inte tas med i beräkningen.

Mätning av förbrukning av handdesinfektionsmedel:

- Mätningen görs av förrådsansvarig eller annan utsedd person.
- Mätperioderna är två veckor åt gången eller annan bestämd period.
- Starta mätningen: Skriv upp startdatum. Räkna och notera antal öppnade handspritflaskor av respektive storlek som finns i enhetens förråd.
- Avsluta mätningen: Skriv upp slutdatum. Räkna och notera antal öppnade handspritflaskor av respektive storlek som finns i enhetens förråd.
- Under mätperioderna: Skriv upp antal av respektive handspritsförpackning som levereras till enheten.
- Beräkna förbrukningen: Ange förbrukningen i liter per förpackningsstorlek (antal öppnade flaskor i lager på enheten vid mätperiodens början + antal levererade flaskor till enheten under mätperioden – antal öppnade flaskor i lager på enheten vid mätperiodens slut).
- Total förbrukning: Lägg ihop antal liter för varje förpackningsstorlek.
- Förbrukning per vård dygn: Dividera total förbrukning i liter med antal vård dygn för perioden.

Resultat

Enhets namn:

Produkt						
Förpackningsstorlek						
Start datum						
Antal förpackningar i lager						
Avslut datum						
Antal förpackningar i lager						
Antal levererade förpackningar under perioden						

Denna publikation kan laddas ner för utskrift eller för tryck på www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander eller på www.skl.se/patientsakerhet

Total förbrukning i liter under perioden:

Förbrukning i milliliter per vård dygn: